

Farbtafel 1



Abb. 1-6: *Acherontia lachesis* (FABRICIUS, 1798), Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419'E, ex larva von 20.XII.2008, THOMAS IHLÉ leg. Ausgewachsene L5-Raupe, Puppe, Imago ♀ (EMEM).

Abb. 7-12: *Acherontia styx styx* WESTWOOD, 1847, Fundortdaten wie in Abb. 1-6, (7, 8) L5-Raupe, seltene Farbform, (9-11) Puppe (starb leider an und vermoderte), (12) Imago ♀

Farbtafel 2




Abb. 1-13: *Ambulyx siamensis* INOUE, 1991, Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419'E, ex larva von 22.-25.IX.2008, THOMAS IHL leg. (1) L3-Raupe vor der Häutung, (2, 3) L4-Raupe, (4-8) L5-Raupe in verschiedenen Farbformen, (9-11) Puppe, (12, 13) Imago ♂ und ♀ (EMEM)

Farbtafel 3



Abb. 1-12: *Clanis titan* ROTHSCHILD & JORDAN, 1903, Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419' E, ex larva von 2.-7.XI.2008, THOMAS IHL leg. (1-9) L5-Raupen, teilweise parasitiert, (10-12) Puppe (Puppen und Raupenhäute im EMEM).

Farbtafel 4



Abb. 1, 2: *Clanis titan* ROTHSCILD & JORDAN, 1903, Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419'E, ex larva von 2.-7.XI.2008, THOMAS IHLÉ leg. (1, 2) Imagines (im EMEM).



Abb. 3-5: *Daphnis nerii* (LINNÆUS, 1758), Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419'E, ex larva von 2.VI.2009, THOMAS IHLÉ leg. (3) L5-Raupe, (4-6) Puppe (Falter und Puppen im EMEM).

Farbtafel 5



Abb. 1-10: *Eupanaera variolosa* (WALKER, 1856), Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419' E, ex larva vom 18.-22. XII.2008, THOMAS IHLER leg. (1, 2) L4-Raupe, (3-5) L5-Raupe, Puppe, (10) Imago ♀ (EMEM).

Farbtafel 6



Abb. 1-17: *Macroglossum corythus corythus* WALKER, 1856, Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419' E, ex larva von 2.-7.XI.2008, THOMAS IHLÉ leg. (1, 2) L1-Raupe, (3, 4) L2-Raupe, (5, 6) L3-Raupe, (7-9) L4-Raupe, (10-12) L5-Raupe, (13-15) Puppe, (16, 17) Imago (+ Puppen im EMEM).

Farbtafel 7




Abb. 1-16: *Macroglossum sitiene* WALKER, 1856, Thailand, Tak Prov., Ban Tak, ca. 50 km N Tak-City, 200 m, 17°07,669'N, 99°06,033'E, ex larva von 18.-22.VI.2009, THOMAS IHLER leg. (1) L1-Raupe, (3, 4) L2-Raupe, (5, 6) L3-Raupe, (7, 8) L4-Raupe, (9-12) L5-Raupe, (13-15) Puppe, (16) Imago (+ Puppen im EMEM).

Farbtafel 8



Abb. 1-19: *Marumba dyras dyras* (WALKER, 1865), Thailand, Tak Prov., Ban Tak, ca. 50 km N Tak-City, 200 m, 17°07,669'N, 99°06,033'E, ex larva von 18.-22.VI.2009, THOMAS IHLÆ leg. (1, 2) L1-Raupe, (3-6) L2-Raupe, (7-9) L3-Raupe, (10-13) L4-Raupe, (14-16) L5-Raupe, (17-19) Puppe.

Farbtafel 9



Abb. 1, 2: *Marumba dyras dyras* (WALKER, 1865), Thailand, Tak Prov., Ban Tak, ca. 50 km N Tak-City, 200 m, 17°07,669'N, 99°06,033'E, ex larva von 18.-22.VI.2009, THOMAS IHL leg. (1, 2) Imago (+ Puppen im EMEM).



Abb. 3-17: *Neogurelca hyas* (WALKER, 1856), Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419'E, ex larva von 18.-20.XI.2008, THOMAS IHL leg. (3, 4) L1-Raupe, (5, 6) L2-Raupe, (7,8) L3-Raupe, (9-12) L4-Raupe, (13-17) L5-Raupe in verschiedenen Farbformen.

Farbtafel 10




Abb. 1-6: *Neogurelca hyas* (WALKER, 1856), Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419'E, ex larva von 18.-20.XI.2008, THOMAS IHL leg. (1) L5-Raupe, (2-4) Puppe, (5, 6) Imago (+ Puppe im EMEM).




Abb. 7-14: *Parum colligata* (WALKER, 1856), Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419'E, ex larva von 20.V.2009, THOMAS IHL leg. (7-9) L1-Raupe, (10-12) L2-Raupe, (13, 14) L3-Raupe.

Farbtafel 11




Abb. 1-18: *Parum colligata* (WALKER, 1856), Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419' E, ex larva von 20.V.2009, THOMAS IHLER leg. (1) L3-Raupe, (2, 3) L4-Raupe, (4-13) L5-Raupe, (14-16) Puppe, (17, 18) Imago (+ Puppen im EMEM).

Farbtafel 12



Abb. 1-6: Kahlfraß am Biotop von *Parum colligata* (WALKER, 1856) an Bäumen von *Broussonetia papyrifera* (Moraceae), Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Umgebung Khao Yai NP, 400 m, 14°38,361' N, 101°25,419' E.

Farbtafel 13



Abb. 1-6: *Pergesa acteus* (CRAMER, 1779), Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Randgebiet des Khao Yai NP, 400 m, ex larva von 10.XII.2008, THOMAS IHLÉ leg. (1) L4-Raupe, (2) L5-Raupe, (3-5) Puppe, (6) Imago (+ Puppe im EMEM).



Abb. 7-15: *Smerinthulus diehli* HAYES, [1982], Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Taplan NP, Ban San Chao Po, 700 m, 12.VI.2008, THOMAS IHLÉ leg. (7) L1-Raupe, (8) L2-Raupe, (9, 10) L3-Raupe, (11, 12) L4-Raupe, (13-15) L5-Raupe.



Abb. 1-6: *Smerinthulus diehli* HAYES, [1982], (1, 2) Thailand, Nakhon Ratchasima Prov., Taplan NP, Ban San Chao Po, 700 m, 12.VI.2008, THOMAS IHLÉ leg. (1) Puppe (starb ab und vermoderte), (2) Imago ♀. (3, 4) ♂, Ober- und Unterseite, Burma, Tenasserim, 1.-24.VIII.1995, via S. STEINKE in EMEM, 8.VIII.1997, EMEM (BC-EMEM1009); (5, 6) ♀, Burma, Tenasserim, 15.IV.1995, via S. STEINKE in EMEM, 23.XI.1997, EMEM.

Abb. 7-10: *Theretra pallicosta* (WALKER, 1856), Thailand, Provinz Tak, Doi Mussae, 800 m, 25.V.2009, THOMAS IHLÉ leg. (7) Imago, (8, 9) L5-Raupe, (10) Puppe.